



VIH y MUJERES

Hubo 4,396 diagnósticos nuevos de infección por el VIH en California en el 2019. De esos diagnósticos, el 15% fueron en mujeres (12% entre las mujeres cisgénero y 3% entre las mujeres transgénero).




UNO de cada siete diagnósticos nuevos del VIH son entre las **MUJERES**


El VIH afecta de manera desproporcionada a las mujeres de raza negra o afroamericanas y a las latinas



Las mujeres de 25 a 34 años tuvieron la mayor cantidad de diagnósticos nuevos del VIH



Las mujeres cisgénero de raza negra o afroamericanas tienen las tasas más altas de nuevos diagnósticos del VIH




Las tasas de diagnósticos nuevos del VIH entre las mujeres cisgénero de raza negra o afroamericanas son 6.9 veces más altas que las de las mujeres cisgénero blancas, y entre las mujeres cisgénero latinas, 1.3 veces más altas que las de las mujeres cisgénero blancas. Aunque las tasas de personas transgénero son desconocidas, prevalencia nacional del VIH entre las personas transgénero se estima en un 9.2%, con las mujeres transgénero entre los grupos más afectados por el VIH.¹

Fuente de las cifras: La Oficina del SIDA del Departamento de Salud Pública de California, Informe de Vigilancia del VIH

¹ Becasen JS, Denard CL, Mullins MM, Higa DH, Sipe TA, Estimating the Prevalence of HIV and Sexual Behaviors Among the US Transgender Population: A Systematic Review and Meta-Analysis, 2006-2017. Am J Public Healthexternal 2018 Nov 29;e1-e8. doi: 10.2105/AJPH.2018.304727.

La mayoría de los diagnósticos nuevos del VIH entre las mujeres se atribuyeron al contacto sexual



Las categorías de riesgo se ordenan por mayor riesgo de transmisión del VIH (consumo de drogas inyectables, contacto sexual y otro). Individuos con múltiples factores de riesgo se reportan en la categoría con mayor probabilidad de resultar en la transmisión del VIH. "Otro" incluye exposición perinatal y factores de riesgo no reportados o no identificados.

PrEP

Profilaxis Preexposición (PrEP) es una pastilla que reduce el riesgo de contraer el VIH a través de las relaciones sexuales en aproximadamente el 99% cuando se toma según las indicaciones. Entre las personas que se inyectan drogas, PrEP reduce el riesgo en al menos un 74% cuando se toma según las indicaciones.²



PrEP es segura para tomar durante el embarazo y la lactancia materna, y puede ayudar a proteger a usted y a su bebé del VIH.



No hay ningún conflicto conocido entre PrEP y la terapia hormonal, y no hay ningún motivo por el cual no se puedan tomar estos medicamentos al mismo tiempo.



PrEP está cubierta por la mayoría de los planes de seguro médico y programas de Medicaid. También hay programas que proveen PrEP gratis o a un costo reducido.

² Eficacia de PrEP (<https://www.cdc.gov/hiv/spanish/basics/prep/prep-effectiveness.html>)



pleaseprepme.org/es/california




getyourprep.com
(855) 447.8410

Prevención del VIH

Estatus de VIH de su Pareja
Conozca el estatus de VIH de su pareja.

Jeringas Limpias
Use jeringas e implementos de inyección limpios cada vez que se inyecte.



Condomes
Ayudan a prevenir la transmisión sexual del VIH y otras ETS.

Servicios Cerca de Usted



Pruebas del VIH

La única manera de saber si tiene el VIH es HACIÉNDOSE LA PRUEBA.

Busque un sitio de pruebas cerca de usted.




locator.hiv.gov

Ordena una prueba casera del VIH GRATUITA.




takemehome.org

indetectable = intransmisible



- Las personas que viven con el VIH pueden llevar una vida larga y saludable. Con tratamiento efectivo, NO son infecciosos.
- El tratamiento efectivo reduce la transmisión del VIH a CERO.
- Actualmente no existe cura para el VIH, pero sí existe tratamiento.
- Si usted es VIH positivo, reciba atención médica, manténgase en tratamiento y viva bien.



Para Más Información: cdphe.ca.gov/programs/cid/daa/pages/hiv-women-additional-resources.aspx