

HPV և HPV-ի դեմ պատվաստում. ինչ պետք է իմանա յուրաքանչյուր ծնող

Ի՞նչ է HPV-ն:

Մարդու պապիլոմավիրուսը (HPV-ն) շատ տարածված վիրուս է, որը 10 մարդուց 8-ը կստանա իր կյանքի ընթացքում: Որոշ HPV վարակներ կարող են հանգեցնել քաղցկեղի ավելի ուշ տարիքում:




Ենթադրվում է, որ ԱՄՆ-ում HPV-ն ամեն տարի տղամարդկանց և կանանց մոտ քաղցկեղի մոտ 37000 դեպք է առաջացնում, ինչը հավասար է բեյսբոլի հիմնական լիգայի խաղերի միջին հաճախելիությանը:

Միայն արգանդի վզիկի քաղցկեղը, որը HPV-ով առաջացած քաղցկեղից մեկն է, հնարավոր է վաղ հայտնաբերել ՊԱՊ թեստով: HPV-ի պատճառով առաջացած մյուս քաղցկեղները (կոկորդի, սեռական օրգանների կամ անոսի քաղցկեղ) հնարավոր է չհայտնաբերվեն, քանի դեռ դրանք ավելի լուրջ չեն: HPV-ի դեմ պատվաստումը կանխում է այս քաղցկեղի առաջացման վարակները:

Ինչպե՞ս կարող եմ պաշտպանել իմ երեխային HPV-ից:

HPV-ի դեմ պատվաստումը կարող է կանխել HPV-ով առաջացած քաղցկեղի ավելի քան 90%-ը: HPV-ի դեմ պատվաստանյութերը շատ անվտանգ են, և գիտական հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ HPV-ի դեմ պատվաստումների օգուտները շատ ավելին են, քան հնարավոր ռիսկերը: 2006 թվականից ի վեր ԱՄՆ-ում տրված ավելի քան 135 միլիոն դեղաչափերով, HPV-ի դեմ պատվաստանյութն ունի անվտանգության երկար պատմություն, որը հաստատված է ավելի քան 15 տարվա մոնիտորինգով: Հաճախակի պատահող կողմնակի ազդեցությունները մեղմ են և լավանում են մեկ կամ երկու օրվա ընթացքում: Դրանք ներառում են ցավ, կարմրություն կամ այտուց պատվաստման տեղում, մյուս պատվաստանյութերի նման:



HPV-ի դեմ պատվաստումը չափազանց լավ է աշխատում: Քանի որ HPV-ի դեմ պատվաստումն առաջին անգամ առաջարկվել է 2006 թվականին, HPV-ի տեսակներով վարակները, որոնք առաջացնում են HPV-ի քաղցկեղի մեծ մասը, նվազել են 88%-ով դեռահաս աղջիկների և 81%-ով՝ երիտասարդ չափահաս կանանց շրջանում:

HPV-ի դեմ պատվաստումն առաջարկվում է Իմունականխարգելման պրակտիկայի դաշնային խորհրդատվական կոմիտեի, Մանկաբուժության ամերիկյան ակադեմիայի և Ընտանեկան բժիշկների ամերիկյան ակադեմիայի կողմից: Այն նաև առաջարկվում է քաղցկեղի ամերիկյան հասարակության և Կալիֆորնիայի քաղցկեղի կանխարգելման ակտի կողմից:

HPV և HPV-ի դեմ պատվաստում. ինչ պետք է իմանա յուրաքանչյուր ծնող

Ո՞վ պետք է պատվաստում ստանա և ե՞րբ պետք է այն ստանա:



Քանի որ պատվաստանյութն ավելի արդյունավետ է, երբ տրվում է ավելի երիտասարդ տարիքում, 9-ից 12 տարեկան բոլոր երեխաների համար խորհուրդ է տրվում պատվաստանյութի երկու դեղաչափ, իսկ երկրորդ դեղաչափը պետք է տրվի մինչև 8-րդ դասարանի սկիզբը:

(Երեխաները, ովքեր ավելի ուշ են ստանում HPV-ի դեմ պատվաստանյութի իրենց առաջին դեղաչափը, կարող է ստիպված լինեն ստանալ երեք դեղաչափ:) HPV-ի դեմ պատվաստանյութը հաճախ տրվում է դեռահասներին այլ պատվաստանյութերի հետ միաժամանակ, ինչպիսիք են Tdap-ը՝ կապույտ հազը կանխելու համար, և մենինգոկոկային պատվաստանյութը՝ բակտերիալ մենինգիտը կանխելու համար:

Որտեղի՞ց կարող եմ ստանալ HPV-ի դեմ պատվաստանյութն իմ երեխայի համար:

Հարցրեք ձեր բուժաշխատողին, դեղագործին կամ տեղական առողջապահական բաժանմունքին՝ HPV-ի դեմ պատվաստանյութի մասին ավելին իմանալու համար և թե որտեղ կարող եք ստանալ այն: Պատվաստանյութն ապահովագրված է առողջության ապահովագրության ծրագրերի մեծ մասով: Եթե դուք չունեք առողջության ապահովագրություն, ձեր երեխան դեռ կարող է պատվաստվել: Պատվաստումներ երեխաների համար (VFC) ծրագիրն առաջարկում է անվճար պատվաստումներ մինչև 18 տարեկան երեխաներին՝ առանց ապահովագրության կամ այն դեպքերում, եթե ապահովագրությունը չի ծածկում պատվաստումների արժեքը:

Հարցրեք ձեր բուժաշխատողին կամ [տեղական առողջապահական բաժանմունքին VFC-](#)ի մասին: Գտեք VFC-ում մասնակցող բժիշկներին [ձեր տարածքում](#):

HPV-ի, պատվաստանյութի և քաղցկեղի կանխարգելման մասին լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք [Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման կենտրոններ](#):