



MARK B HORTON, MD, MSPH
Director

State of California—Health and Human Services Agency California Department of Public Health



ARNOLD SCHWARZENEGGER
Governor

ການປ້ອງກັນຕົວທ່ານເອງກັບລູກອ່ອນຂອງທ່ານ

ຫາກທ່ານຖືກຢູ່ຫລືຄິດວ່າອາດເປັນໄດ້ທີ່ທ່ານຕັ້ງທ້ອງແລ້ວ ທ່ານຕ້ອງຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບເຊື້ອ HIV ຄືເຊື້ອໄວຣັສທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດພະຍາດເອັດສ໌.

ເວລາທີ່ຖືກພົບເປັນຊ່ວງເວລາທີ່ທ່ານຄວນເບິ່ງແຍງຕົວເອງໃຫ້ດີແລະຄວນເຂົ້າໄປກວດຮ່າງກາຍຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີເພື່ອສຸກຂະພາບຂອງຕົວທ່ານເອງແລະສຸກຂະພາບຂອງລູກອ່ອນຂອງທ່ານ. ຜູ້ຮັກສາສຸກຂະພາບຂອງທ່ານຈະຖາມແລະກວດຄົ້ນເຖິງອາການສຸກຂະພາບຂອງທ່ານ ເພື່ອໃຫ້ສຸກຂະພາບຂອງທ່ານແລະລູກອ່ອນຂອງທ່ານຈະແຂງແຮງເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້. ຈະມີການກວດຄົ້ນເຊື້ອ HIV ໃນຕົວທ່ານເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງກິດຈະວັດກວດຮັກສາລະຫວ່າງການຖືພາ ຫລືເມື່ອຕອນທ່ານປວດທ້ອງໄກ້ຈະຄອດ ເວັ້ນໄວ້ແຕ່ທ່ານບໍ່ຍອມໃຫ້ກວດ. ການກວດຄົ້ນເຊື້ອ HIV ລະຫວ່າງການຖືພາບໍ່ເປັນທາງເລືອກທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບແມ່ກັບລູກ.

ເຊື້ອ HIV ແມ່ນຫຍັງ?

ເຊື້ອ HIV (Human Immunodeficiency Virus) ກໍ່ໃຫ້ເກີດພະຍາດຊະນິດນຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ລະບົບຕ້ານທານພະຍາດອ່ອນແອລົງ ຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຕ້ານທານການຕິດເຊື້ອຕ່າງໆໄດ້ຍາກ.

ເຊື້ອ HIV ຕິດແປດກັນຢ່າງໃດ?

ເຊື້ອ HIV ແຕ່ຕິດສ່ວນຫລາຍໂດຍການມີເພດສໍາພັນຢ່າງບໍ່ປ້ອງກັນຕົວ ຫລືໂດຍການໃຊ້ເຂັມສັກຢາຮ່ວມກັນກັບຜູ້ທີ່ມີເຊື້ອ HIV ຢູ່ແລ້ວ. ຜູ້ຍິງໃນສະຫະລັດສ່ວນຫລາຍຕິດເຊື້ອ HIV ໂດຍການຮ່ວມເພດກັບຜູ້ຊາຍ.

ຜູ້ຍິງທີ່ຖືພາຜູ້ຊຶ່ງຕິດເຊື້ອ HIV ຫລືພະຍາດເອັດສ໌ຢູ່ແລ້ວ ສາມາດເຮັດໃຫ້ລູກອ່ອນຕິດເຊື້ອ HIV ໄດ້ໃນລະຫວ່າງການຖືພາ ການຄອດລູກ ແລະການປ້ອນນໍ້ານົມໃຫ້ລູກກິນ.

ການກວດຄົ້ນເຊື້ອ HIV ຈະຊ່ວຍລູກຂອງຂ້າພະເຈົ້າຢ່າງໃດ?

ການກວດຄົ້ນເຊື້ອ HIV ຈະຊ່ວຍທ່ານແລະລູກອ່ອນຂອງທ່ານໃນກໍລະນີທີ່ທ່ານມີເຊື້ອ HIV ໂດຍເຕືອນໃຫ້ທ່ານຮູ້ເຖິງຄວາມຈໍາເປັນທີ່ຈະຮັບການປິ່ນປົວ. ການປິ່ນປົວລະຫວ່າງການຖືພາ ການປວດທ້ອງຄອດ ແລະການຄອດລູກ ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະຖ່າຍທອດເຊື້ອ HIV ເຖິງລູກອ່ອນຂອງທ່ານລົດນ້ອຍລົງໄດ້.

ທາງການແພດມາຮຽນຮູ້ວ່າ ຫາກທ່ານຕິດເຊື້ອ HIV ຢູ່ແລ້ວ ການປິ່ນປົວດ້ວຍຢາທີ່ເໝາະສົມສາມາດລົດຄວາມສ່ຽງທີ່ທ່ານຈະເຮັດໃຫ້ລູກຂອງທ່ານຕິດເຊື້ອ HIV ໃຫ້ນ້ອຍລົງໄດ້ຢ່າງຍິ່ງ.

ຈະເປັນຢ່າງໃດຖ້າຫາກຂ້າພະເຈົ້າມີເຊື້ອ HIV?

ຫາກທ່ານມີເຊື້ອ HIV ທ່ານຕ້ອງການຈະໄປປຶກສາກັບທ່ານໝໍຂອງທ່ານເລື່ອງທີ່ວ່າການປິ່ນປົວມີທາງເລືອກອັນໃດແດ່. ທ່ານໝໍທ່ານຈະແນະນຳທ່ານກ່ຽວກັບຢາທີ່ຖືວ່າປອດໄພໃຊ້ລະຫວ່າງການຖືພາ. ທ່ານອາດຈະໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນໃຫ້ໃຊ້ຢາຕໍ່ໄປຫລັງຈາກຄອດລູກແລ້ວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເພື່ອສຸກຂະພາບຂອງທ່ານເອງ ຊຶ່ງຈະແລ້ວແຕ່ປັດໄຈຕ່າງໆ.

ທ່ານສາມາດປ້ອງກັນຕົວເອງຈາກການຕິດເຊື້ອ HIV ໂດຍ:

- ໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມ (ສໍາລັບຍິງຫລືຊາຍ) ທີ່ປະກອບດ້ວຍ ເລ່ແທັກ (latex) ຫລື ໄພລີຢູຣະເຕນ (polyurethane) ເມື່ອທ່ານຮ່ວມເພດເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານຖືພາຢູ່ກໍຕາມ. ໃຫ້ໃຊ້ຂອງມື້ນທີ່ປະກອບດ້ວຍທາດນໍ້າ (water-based lubricant) ເທົ່ານັ້ນ. ສ່ວນຂອງມື້ນທີ່ປະກອບດ້ວຍນໍ້າມັນ ຈະເຮັດໃຫ້ຖົງຢາງອະນາໄມອ່ອນລົງແລະຈະເຮັດໃຫ້ການໃຊ້ໄດ້ຜົນລົດນ້ອຍລົງ.
- ບໍ່ໃຊ້ເຂັມສັກຢາຮ່ວມກັນເພື່ອສັກຢາທົ່ວໄປ, ສັກຢາສະເຕຣອຍດ໌ (steroid), ສັກໄວຕາມິນ, ສັກລາຍ, ຫລືເພື່ອເຈາະຮູຕາມຜິວຫນັງ.

ຄວາມຊ່ວຍເຫລືອທາງອື່ນໆ:

ໃຫ້ໂທຮັບໄປຕາມສາຍດ່ວນເລື່ອງ HIV ກັບພະຍາດເອັດສ໌ ຂອງລັດຄາລິຟໍເນັງ (California) ທີ່ 1-800-367-2437 ເພື່ອຈະໄດ້ຮັບຄວາມຊ່ວຍເຫລືອດ້ານການສົ່ງຕໍ່ແລະການປຶກສາເລື່ອງ HIV ຮ່ວມທັງຜູ້ຊ່ວຍຊານໃນການປິ່ນປົວ HIV ລະຫວ່າງການຖືພາ ຊຶ່ງຢູ່ໃກ້ຄຽງກັບພື້ນທີ່ຂອງທ່ານ.